

# Planificador de dosis SMArt

Ahora está recibiendo sus dosis de mantenimiento de SPINRAZA® (nusinersén), lo que significa que se le administra una dosis cada 4 meses. Es importante sentirse preparado y abordar las posibles dificultades para un tratamiento oportuno. Para ayudar a prepararse para las dosis futuras, hemos creado este planificador de dosis SMArt.

**Utilice esta herramienta para planificar y hacer un seguimiento de sus citas de dosis a lo largo del tiempo, registrar fechas importantes e información de contacto y registrar cualquier pregunta o inquietud para su equipo de atención.**

Fecha de la dosis más reciente: \_\_\_\_\_

## DOSIS INICIALES



## DOSIS 3 VECES POR AÑO

SPINRAZA es una inyección intratecal, o una inyección en el líquido de la columna vertebral, realizada por un proveedor de atención médica (healthcare provider, HCP) con experiencia en la realización de punciones lumbares. La dosis recomendada de SPINRAZA es de 12 mg (5 ml) por administración.

Dosis 3 veces por año	Fecha de vencimiento de la dosis	Fecha de la cita clínica/MDA	Función motora/Fecha de la cita de PT	Fecha de análisis
DOSIS 1				
DOSIS 2				
DOSIS 3				

## INFORMACIÓN DEL SEGURO

Autorización previa del seguro (Prior Authorization, PA)	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACIÓN:
Reautorización enviada por	NOMBRE:	FECHA:

## CONTACTOS IMPORTANTES

Gestor de acceso familiar (Family Access Manager, FAM)	NOMBRE/INFORMACIÓN DE CONTACTO:
Personal de enfermería de la consulta del médico prescriptor	NOMBRE/INFORMACIÓN DE CONTACTO:
Contacto de programación de dosis	NOMBRE/INFORMACIÓN DE CONTACTO:
Otros contactos	NOMBRE/INFORMACIÓN DE CONTACTO:
	NOMBRE/INFORMACIÓN DE CONTACTO:

**RECORDATORIO:** Notifique a su FAM y al equipo de atención médica cualquier cambio en el seguro lo antes posible.

## INDICACIÓN

SPINRAZA® (nusinersén) es un medicamento recetado que se usa para tratar la atrofia muscular espinal (AME) en pacientes pediátricos y adultos.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SELECCIONADA

**Se ha observado un aumento del riesgo de complicaciones hemorrágicas** tras la administración de medicamentos similares. Su proveedor de atención médica debe realizarle análisis de sangre antes de que usted comience el tratamiento con SPINRAZA y antes de cada dosis para vigilar los signos de estos riesgos. Busque atención médica si se produce una hemorragia inesperada.

**Consulte la Información importante de seguridad adicional en el reverso y haga clic para ver la [Información de prescripción completa](#).**

# Consideraciones para la dosificación oportuna

## Prepárese

**Prepárese** para las interacciones con su equipo de atención

// **Anote las preguntas y los recordatorios** en la sección de notas para ayudar a organizarse antes de las futuras citas

// **Tenga en cuenta los compromisos planificados previamente al programar** las citas de la clínica y del día de la dosis

## Esté listo

// Asegúrese de que **su seguro está actualizado** y de que está familiarizado con los criterios de cobertura de su seguro para SPINRAZA para determinar qué pasos pueden ser necesarios para continuar con el tratamiento

// Asegúrese de haber **realizado cualquier análisis de laboratorio necesario** antes de cada dosis



**IAN // EDAD 36 // AME DE INICIO TARDÍO**

“Ahora siento que soy proactivo y que hago algo que me puede ayudar”.

**Si ha perdido una dosis o cree que podría perderse una dosis en el futuro, haga un seguimiento con su médico para analizar los pasos a seguir.**

**Notas:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

**Se ha observado un aumento del riesgo de daño renal, incluida una inflamación aguda del riñón potencialmente mortal**, tras la administración de medicamentos similares. Su proveedor de atención médica debe realizarle análisis de orina antes de que comience el tratamiento con SPINRAZA y antes de cada dosis para vigilar los signos de este riesgo.

**Los efectos secundarios más frecuentes de SPINRAZA incluyen** infección de las vías respiratorias bajas, fiebre, estreñimiento, dolor de cabeza, vómitos, dolor de espalda y síndrome posterior a la punción lumbar.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de SPINRAZA. Consulte a su proveedor de atención médica sobre los efectos secundarios. Puede notificar los efectos secundarios a la FDA en el 1-800-FDA-1088.

**Antes de tomar SPINRAZA, informe a su proveedor** de atención médica si está embarazada o planea quedar embarazada.

**Consulte la Información de prescripción completa.**

Esta información no pretende reemplazar las conversaciones con su proveedor de atención médica.